

PRIMSTAR 20 SG

SKUTECZNOŚĆ

Błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się wraz z sokami roślinnymi. Zwalcza chwasty już w temperaturze 5-6°C. Pierwsze objawy działania widoczne są już po kilku godzinach od wykonania zabiegu.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczny dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych - od fazy 3 liścia zbóż ozimych, aż do końca fazy strzelania w źdźbło. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty w fazie 2-6 liści. Primstar charakteryzuje się wyjątkową selektywnością w stosunku do zbóż.

KOMFORT

Formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze.

ZAKRES

Herbicydy zawierające metsulfuron metylu posiadają rejestracje w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym oraz pszenicy jarej.



HERBICYDY

Środki do zwalczania chwastów.

FUNGICYDY

Środki do ochrony roślin przed chorobami.



INSEKTYCYDY

Środki do ochrony roślin przed szkodnikami.



PRIMSTAR 20 SG

INNIGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
tel. +48 (22) 468 26 70
email: biuro@innvigo.com
www.innvigo.com
facebook.com/innvigo



TWÓJ SKUTECZNY POMOCNIK!
Zwalcza chwasty dwuliścienne w zbożach

www.innvigo.com

PRIMSTAR 20 SG



Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach - zawiera metsulfuron metylu.

Skuteczne narzędzie w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, PrimStar to herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych.

PrimStar 20 SG


Każde pole ma swoją specyfikę, także w zakresie występujących chwastów, zabiegi są wykonywane w warunkach zmiennej pogody. Z tych względów warto korzystać z technologii stworzonych przez specjalistów, potwierdzonych przez praktykę rolniczą.

Rekomendacje stosowania herbicydu PrimStar w zależności od rodzaju zachwaszczenia

Zwalczanie chwastów dwuliściennych


ZBOŻA OZIME (PSZENICA, PSZENŻYTO, ŻYTO)

Środek stosować od fazy 3 liści - najpóźniej do końca krzewienia



ZBOŻA JARE (JĘCZMIEN)

Środek stosować od fazy 3 liści - najpóźniej do końca krzewienia



W innych krajach europejskich, z uwagi na szerokie okno aplikacji i bezpieczeństwo dla zbóż, powszechne jest stosowanie środka PrimStar 20 SG również jesienią.


Techologia zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych

PrimStar 20 SG obok działania na chwasty dwuliścienne ogranicza wzrost i rozwój miotły zbożowej, dzięki czemu jest doskonałym partnerem do tworzenia skutecznych mieszanin z innymi herbicydami.

Łączne stosowanie PrimStar 20 SG w mieszaninie ze środkiem z innej grupy chemicznej, np. zawierającym chlorotoluron jest elementem dobrej praktyki rolniczej i przeciwdziała powstawaniu odporności chwastów. Mieszanina z diflufenikanem to skuteczne rozwiązanie przeciwko fiołkom i lepsze zwalczanie miotły.

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

Środek stosować od fazy 3 liści - najpóźniej do końca fazy 1-go kolanaka



Do każdej kombinacji koniecznie dodaj adiuwant SILITOP w dawce 0,1 l/ha
Pamiętaj! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

LISTA ZWALCZANYCH CHWASTÓW (DOŚWIADCZENIA WŁASNE)

CHWAST		CHWAST	
Bodiszek drobny	+++	Rumianek pospolity	+++
Fiołek polny	+++	Rzodkiew świerzepa	+++
Gorczyca polna	+++	Samosiewy rzepaku	+++
Gwiazdnica pospolita	+++	Sporek polny	+++
Jasnota purpurowa	+++	Szczaw polny	+++
Jasnota różowa	+++	Tasznik pospolity	+++
Komosa biała	+++	Tobołki polne	+++ (30g)
Kurzyśląd polny	+++	Chaber bławatek	++ (30g)
Mak polny	+++	Dymica pospolita	++
Maruna bezwonna	+++	Rdest powojowaty	++
Niezapominajka polna	+++	Ostrożeń polny	+
Poziewnik szorstki	+++	Miotła zbożowa	+
Przetacznik perski	+++		

Skuteczność: Wysoka +++ Średnia ++ Słaba +

PROFIL PRODUKTU WG ETYKIETY REJESTRACYJNEJ

ZWALCZANE CHWASTY

Wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Średnio wrażliwe: chaber bławatek, komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

ZALECANA DAWKA DLA JEDNORAZOWEGO ZASTOSOWANIA

Ozime: pszenica, pszenżyto i żyto: 30 g/ha. Jęczmień jary: 20 g/ha

TERMIN STOSOWANIA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime: faza krzewienia, najpóźniej do końca fazy 1-go kolanaka. Jęczmień jary: faza krzewienia.

ZAREJESTROWANE MIESZANINY ZBIORNIKOWE

Zboża ozime:

PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha.
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,4-0,6 l/ha.
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha.

Jęczmień jary:

PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25 – 0,4 l/ha.
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25 – 0,4 l/ha.
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25 – 0,4 l/ha.

REKOMENDOWANY ADIUWANT Asystent 90 EC

ZALECANA ILOŚĆ WODY: 200-300 l/ha

ZALECANE OPRYSKIWANIE: Średniokropliste