

TYTAN 75 SG

✓ SKUTECZNOŚĆ

Błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się systemicznie. Zwalcza miotłę i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6°C. Do stosowania powschodowego wiosną, a także we wczesnych zasiewach zbóż.

✓ BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczny dla rośliny uprawnej od fazy 3 liścia do pierwszego kolanka zbóż.

✓ SELEKTYWNOŚĆ

Produkty zawierające metsulfuron i tifensulfuron metylu posiadają rejestracje w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej oraz pszenżycie jarym.

✓ ELASTYCZNOŚĆ

Może być stosowany z innymi herbicydami co zwiększa skuteczność przy dużym nasileniu chwastów, np. do zwalczania przytuli może być stosowany w mieszaninie ze środkiem zawierającym fluroksypyr, a do zwalczania miotły ze środkami zawierającymi np. izoproturon, chlorotoluron lub diflufenikan.

✓ KOMFORT

Formulacja SG zapewnia natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu, dzięki czemu przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza łatwiejsze i oszczędniejsze.



HERBICYDY

Środki do zwalczania chwastów.

FUNGICYDY

Środki do ochrony roślin przed chorobami.



INSEKTYCYDY

Środki do ochrony roślin przed szkodnikami.

NAWOZY DOLISTNE I BIOSTYMULATORY



innigo

Better chemistry



REWELACYJNA
CENA



TYTAN 75 SG

TWÓJ SKUTECZNY POMOCNIK!
zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne

✉ BIURO@INNVIGO.COM

☎ +48 (22) 468 26 70

INNIGO SP. Z O.O. AL. JEROZOLIMSKIE 178, 02-486 WARSZAWA

www.innvigo.com

TYTAN 75 SG



Powschodowy herbicyd zwalczający miotłę i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, zawierający dwie wyjątkowo skuteczne i znakomicie uzupełniające się substancje aktywne.

Metsulfuron i tifensulfuron metylu - połączone w nowoczesnej formulacji SG, tworzą herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, który błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

Informacje Dodatkowe

Stosowanie substancji o różnych mechanizmach działania w przedstawionych technologiach ochrony herbicydowej zwiększa skuteczność zabiegu, a także przeciwdziała powstawaniu odporności chwastów.

UWAGA! Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.

PAMIĘTAJ! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


TYTAN 75 SG

Rekomendacje stosowania herbicydu Tytan 75 SG w zależności od poziomu zachwaszczenia.

WIOSENNE ZWALCZANIE PEŁNEGO SPEKTRUM CHWASTÓW

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME


Środek stosować od fazy 3 liści - najpóźniej do końca fazy 1-go kolanika



SILNE WYSTĘPOWANIE MIOTŁY ZBOŻOWEJ

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME


Środek stosować od fazy 3 liści - najpóźniej do końca fazy 1-go kolanika



SILNE WYSTĘPOWANIE MIOTŁY ZBOŻOWEJ, PRZYTULII CZEPNEJ I INNYCH CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

Środek stosować od fazy 3 liści - najpóźniej do końca fazy 1-go kolanika



* Zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem SILITOP 90 EC w dawce 0,1 l/ha

LISTA ZWALCZANYCH CHWASTÓW (DOŚWIADCZENIA WŁASNE)

Miotła zbożowa	+++	Komosa biała	+++
Fiołek polny	+++	Przetacznik perski	++
Gwiazdnica pospolita	+++	Rdest powojowaty	+++
Mak polny	+++	Dymnica pospolita	+++
Maruna bezwonna	+++	Rumianek pospolity	+++
Samosiewy rzepaku	+++	Rzodkiew świerzepa	+++
Bodziszek drobny	+++	Gorczyca polna	+++
Niezapominajka polna	+++	Kurzyślak polny	+++
Jasnota purpurowa	+++	Sporek polny	+++
Jasnota różowa	+++	Chaber bławatek	+
Poziewnik szorstki	+++	Ostrożeń polny	+
Tasznik pospolity	+++	Przytulia czepna	++
Tobołki polne	+++		

Skuteczność: Wysoka +++ Średnia ++ Słaba +

PROFIL PRODUKTU WG ETYKIETY REJESTRACYJNEJ

RODZAJ PREPARATU: Powschodowy herbicyd zwalczający miotłę i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych

SUBSTANCJE AKTYWNE

tifensulfuron metylu – związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika – 68.2%
metsulfuron metylu – związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika – 6.8%.

FORMULACJA UŻYTKOWA: SG - granule rozpuszczalne w wodzie

ROŚLINY CHRONIONE: Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

ZALECANA DAWKA:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 70-90 g/ha.

TERMIN STOSOWANIA:

W pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym środek stosować wiosną po ruszeniu vegetacji do fazy 1-go kolanika (BBCH 21-30).

ZAREJESTROWANE MIESZANINY ZBIORNIKOWE:

W celu podniesienia skuteczności w zwalczaniu chwastów w uprawie żyta ozimego i pszenżyta ozimego zaleca się stosowanie łącznie:

Tytan 75 SG 70 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25 l/ha
Tytan 75 SG 70 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25 l/ha
Tytan 75 SG 70 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25 l/ha

REKOMENDACJA DOTYCZĄCA ADIUWANTU:

W pszenicy ozimej, w warunkach niesprzyjających działaniu środka TYTAN 75 SG (susza, niska temperatura) przy stosowaniu solo zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT+90 EC w dawce 0,1 l/ha.

W życie ozimym i pszenżycie ozimym środek TYTAN 75 SG stosować zawsze z dodatkiem adiuwanta Partner+ w dawce 0,5 l/ha przy stosowaniu solo.

ZALECANA ILOŚĆ WODY: 200 - 300 l/ha

ZALECANE OPRYSKIWANIE: średniokropliste