

DOBRE ROZWIĄZANIA NIE MUSZĄ BYĆ DROGIE

innvigo

Better chemistry

REWELACYJNA
CENA



Jesteś zainteresowany?

Pytaj u DOBRYCH sprzedawców środków ochrony roślin
w swojej okolicy!

To, czego być może potrzebujesz, to Bukat 500 SC.



FUNGICYDY



INSEKTYCYDY



HERBICYDY



FRUITSMART



REGULATORY
WZROSTU



NAWOZY
SPECJALISTYCZNE
I BIOSTYMULATORY

www.innvigo.com

innvigo
Better chemistry

+48 (22) 468 26 70

biuro@innvigo.com

facebook.com/innvigo

instagram.com/innvigo_eu



BUKAT 500 SC

Jeden fungicyd,
wiele możliwości

BUKAT 500 SC

JEDEN FUNGICYD, WIELE MOŻLIWOŚCI

Bazą fungicydu Bukat 500 SC jest znany i sprawdzony **tebukonazol**. To co odróżnia Bukat od innych fungicydów, to najwyższa koncentracja substancji aktywnej w 1 litrze, dzięki czemu zyskuje on wyjątkowo dynamiczne działanie. Niższa dawka, mniej opakowań i atrakcyjny koszt zabiegu mają znaczenie niezależnie od tego na jakiej powierzchni stosujemy środek ochrony roślin, bo dobre rozwiązania nie muszą być drogie.

Bukat jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego przeznaczonym do ochrony zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Zapobiega, leczy, wyniszcza, a jak trzeba reguluje - to Bukat 500 SC

Zastosowanie w RZEPAKU OZIMYM

Możliwe warianty ochrony rzepaku ozimego z wykorzystaniem preparatu Bukat przedstawia tabela 1.

Zwalczane choroby	Dawkowanie / Zarejestrowane mieszaniny zbiornikowe	Terminy stosowania
Rzepak ozimy: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób		
Program ochrony		
czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych	BUKAT 500 SC 0,4l / ha + Dafne 250 EC 0,3l / ha	JESIEŃ - zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17).
	BUKAT 500 SC 0,5l / ha	WIOSNA - zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68).
Wiosna stosowanie solo		
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych	BUKAT 500 SC 0,5l / ha	Zabieg wykonać od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych (BBCH 31-51).
Wiosna stosowanie w mieszaninach		
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych	BUKAT 500 SC 0,25l / ha + Dafne 250 EC 0,5l / ha	Zabieg wykonać od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych (BBCH 31-51).

Oprócz działania grzybobójczego preparat poprawia pokrój roślin rzepaku poprzez ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego rzepaku. Maksymalnie w rzepaku można wykonać 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym (1 jesienią i 1 zabieg wiosną).

Zastosowanie w ZBOŻACH

Zwalczane choroby	Dawkowanie / Zarejestrowane mieszaniny zbiornikowe	Terminy stosowania
Zboża jare i ozime : środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób. Maksymalna / zalecana dawka 0,5l / ha.		
Pszenica ozima		
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowa liści pszenicy, septorioza plew	BUKAT 500 SC 0,4l / ha + Dafne 250 EC 0,3l / ha lub BUKAT 500 SC 0,25l / ha + Weto 250 EC 0,5l / ha	zabieg wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej oraz od fazy widocznych pierwszych ości do fazy zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie w odstępach co 21 dni.
Pszczytło ozime		
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści	BUKAT 500 SC 0,25l / ha + Weto 250 EC 0,5l / ha	zabieg wykonać od fazy 4. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej oraz od fazy widocznych pierwszych ości do fazy zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 34-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie w odstępach co 21 dni.
Żyto ozime		
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta	BUKAT 500 SC 0,25l / ha + Weto 250 EC 0,5l / ha	zabieg wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej oraz od fazy widocznych pierwszych ości do fazy zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie w odstępach co 21 dni.
Jęczmień jary		
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia	BUKAT 500 SC 0,25l / ha + Weto 250 EC 0,5l / ha	zabieg wykonać od fazy 3. kolanka do fazy pełni kłoszenia gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie w odstępach co 21 dni.

W zbożach można wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

Bukat 500 SC - jeden fungicyd, wiele możliwości!

UWAGA: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, zamieszczonych w etykiecie.