

DOBRE ROZWIĄZANIA NIE MUSZĄ BYĆ DROGIE



**LEPSZY PLON
WYŻSZY ZYSK**

PRODUKTY DLA SADOWNICTWA



Better chemistry

Heros 450 SC

Zawartość substancji czynnej:

pirymetanił (związek z grupy anilinopirymidyn) – 450 g/l (41,40 % w/w)

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

PARCZ JABŁONI

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
0,7–1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**

Minimalny odstęp między zabiegami: **7 dni**

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7–10 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

Okres karencji: **28 dni**

WYBIERZ HEROS 450 SC!

- Najwyższa zawartość substancji aktywnej
- Stosowanie również w niskiej temperaturze
- Działanie interwencyjne 72 godzin wstecz

PIERWSZY NA STARCIE DO WALKI Z PARCEM





difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

VIGOFUN 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

Okres karencji: **28 dni**

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha

Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco. Zabiegi wykonywać w okresie od fazy zielonego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69), co 10–14 dni, nie więcej niż 1–3 razy w sezonie.

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej **10 dni**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha

Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od fazy pojawienia się pąków do początku rozwoju owoców (BBCH 55-71), co 7–14 dni, nie więcej niż 1–3 razy w sezonie.

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej **7 dni**



DeLux 050 CS

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,93% w/w)

OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w roślinach rolniczych: rzepaku ozimym, pszenicy ozimej oraz jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

MSZYCA JABŁONIOWA

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
0,25 l/ha

Środek w zalecanej dawce ogranicza również występowanie zwójek.

Zalecana ilość wody: **500–600 l/ha**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

Okres karencji: **7 dni**

DELUX 050 CS - niezastąpiona ochrona Twoich upraw!

EFEKTYWNIIE ZWALCZA:

- Mszycę jabłoniową
- Słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego w rzepaku ozimym
- Skrzypionki w pszenicy ozimej

**SKUTECZNIE ELIMINUJE
KOLONIE MSZYC JABŁONIOWYCH**



NAVU FORTE

NANOTECHNOLOGICZNY NAWÓZ DOLISTNY



PRZEZNACZENIE

Wieloskładnikowy nawóz dolistny, wyprodukowany przy użyciu nanotechnologii, do stosowania we wszystkich uprawach polowych, warzywniczych gruntowych i pod osłonami, sadowniczych, plantacjach roślin jagodowych oraz roślin ozdobnych. Jego skład to unikatowe połączenie wyselekcjonowanych minerałów, które powstały 14 milionów lat temu. Składniki pokarmowe w nawozie występują w postaci **nanocząsteczek pochodzenia naturalnego**.

OPIS DZIAŁANIA

- Podwyższenie zawartości chlorofilu w liściach
- Intensywna stymulacja fotosyntezy
- Pobudzenie roślin do wzrostu
- Skuteczne zaopatrzenie roślin w makroskładniki i mikroskładniki pokarmowe występujące w nawozie w formie nanocząsteczek
- Zwiększenie odporności roślin na stres wodny oraz przymrozki
- Zmniejszenie podatności roślin na choroby grzybowe
- Przyrost wysokiej jakości plonu

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz dolistny w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Dawka pojedynczej aplikacji to 4–5 kg/ha, w zależności od rodzaju uprawy, wymieszana z 200–400 l wody. W zależności od uprawy zaleca się wykonanie od 1 do 4 zabiegów. Stężenie cieczy opryskowej to 1–2,5%. Należy ściśle przestrzegać pH 6–10 aplikowanej cieczy opryskowej.

Zaleca się zastosowanie dodatkowej dawki, oprócz podanych, w celu zwiększenia odporności upraw na wzmożone warunki stresowe. Zaleca się stosować nawóz łącznie z adiuwantem niejonowym ASYSTENT + lub SILITOP.



SKŁAD NAWOZU:

Zawartość składników pokarmowych [% m/m]:

Azot (N) całkowity	8,0
Azot (N) w formie amidowej	8,0
Tlenek potasu (K ₂ O) rozpuszczalny w wodzie	10,0
Wapń całkowity w przeliczeniu na CaO	21,0
Wapń rozpuszczalny w wodzie w przeliczeniu na CaO	3,0
Tlenek magnezu (MgO) całkowity	3,0
Trójtlenek siarki (SO ₃) rozpuszczalny w wodzie	10,0
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie	0,10
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie	0,10
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie	0,10
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie	0,05



NAWOZY DOLISTNE I BIOSTYMULATORY

Zawartość substancji czynnej:

1-metylocyklopropen (substancja z grupy pochodnych cyklopropenu) – **33 g/kg (3,3%)**

OPIS DZIAŁANIA

Środek używany do utrzymywania wysokiej jędrności jabłek, opóźniania procesów przejrzenia i zmniejszeniu oparzelizny podczas przechowywania. Działa poprzez wyhamowanie produkcji etylenu i wszelkich procesów zachodzących w owocach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez sam owoc, jak i pobranego przez owoc z otoczenia. Jest sformułowany w postaci proszku zawartego w wodnorozpuszczalnych saszetkach, który zmieszany z wodą powoduje uwolnienie się lotnej substancji czynnej, która następnie przedostaje się do tkanek jabłka.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,068 g/m³ chłodni**

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: **0,037– 0,068 g/m³ chłodni**

Termin stosowania:

Jabłka przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być dokonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających na zabieg w temperaturze powyżej 10°C. Zabieg może być dokonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C jak również w czasie chłodzenia.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: **1**

Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: **8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g.**

WYKONANIE ZABIEGU

Pojemnik zaopatrzonej w pompę do mieszania wody wypełnić wodą i umieścić w niewielkiej odległości od drzwi chłodni. Uruchomić pompę i woreczki foliowe z właściwie dobraną ilością środka wrzucić do pojemnika z wodą. Folia rozpuszcza się w ciągu 2 minut. W tym czasie chłodnię należy opuścić, szczelnie zamykając i zabezpieczając przed dostępem nieupoważnionych osób oraz umieścić tabliczkę „Zamknięte – nie wchodzić”. Pomieszczenia nie otwierać przez 24 godziny. Po tym czasie włączyć wentylację, otworzyć chłodnię i przed wejściem do niej wietrzyć przez 15 minut.

Smartujesz? Więcej zyskujesz!

POLSKI PRODUKT

FruitSmart to jedyny polski środek do przechowywania owoców zawierający 1-MCP

ŁATWY DOSTĘP

Legalny polski produkt, dostępny we wszystkich dobrych sklepach ze środkami ochrony roślin

MNIEJ USZKODZEŃ

Minimalizuje ryzyko uszkodzeń owoców i strat podczas przechowywania

DŁUŻSZA ŚWIEŻOŚĆ

Opóźnia procesy przejrzenia i sprawia, że owoce dłużej zachowują swoją naturalną świeżość

NIEZALEŻNOŚĆ

Samodzielna, łatwa aplikacja

LEGALNY I TANI

FruitSmart to legalny, polski produkt, posiadający zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UNIWERSALNOŚĆ

Do każdej, szczelnej przechowalni

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Pozwala zachować jakość owoców zarówno w transporcie, jak i na półkach sklepowych



WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Lepszy produkt to więcej możliwości sprzedaży, wyższa cena i zysk

Zastosuj legalny środek FruitSmart i ciesz się efektami swojej pracy.

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.



INSEKTYCYDY

Środki do ochrony roślin przed szkodnikami




HERBICYDY

Środki do zwalczania chwastów



FUNGICYDY

Środki do ochrony roślin przed chorobami



FRUITSMART

Środek do przechwalnictwa jabłek



NAWOZY SPECJALISTYCZNE BIOSTYMULATORY



REGULATORY WZROSTU

POLSKI PRODUCENT ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW SPECJALISTYCZNYCH



INNIGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
www.innigo.com

+48 (22) 468 26 70
biuro@innigo.com
facebook.com/innigo
instagram.com/innigo_eu

