

# Baristo<sup>500 SC</sup>

## Skoncentrowany na zwalczaniu chwastów w truskawce

#wyberamINNVIGO



Jesienna ochrona herbicydowa  
pozwała wykluczyć wiosenne  
pielenie mechaniczne i kosztowne  
pielenie ręczne w międzyrzędziach.



\* w stosunku do środka  
standardowego zawierającego  
450 g/l napropamidu.

**Wyższa zawartość  
napropamidu o 11%\***

**Niższa dawka\***

**Skuteczna i tańsza ochrona\***

**innigo**  
Better chemistry

Kontakt:  
+48 22 468 26 70  
biuro@innvigo.com

[www.innvigo.com](http://www.innvigo.com)





## CHWASTY WRAŻLIWE

bodziszek drobny  
gwiazdnica pospolita  
komosa biała  
maruna bezwonna  
rdestówka powojowata  
tasznik pospolity  
rumian polny

Najważniejszy czas na pielęgnację plantacji zaczyna się tuż po zbiorach i od niego zależy plonowanie w kolejnym sezonie. Na plantacjach, na których kontynuowana będzie produkcja w kolejnym roku, istotne jest wykonanie kilku zabiegów agrotechnicznych takich jak nawożenie, niszczenie rozłogów i kontrola zachwaszczenia.

## CHWASTY ŚREDNIOWRAŻLIWE

chaber bławatek  
iglica pospolita  
tobołki polne

Baristo 500 SC wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liście. Środek zwalcza siewki wielu uciążliwych chwastów takich jak np. gwiazdnica, komosa, maruna, rdestówka powojowata, stwarzając sprzyjające warunki dla wzrostu i rozwoju truskawki.

## CHWASTY ŚREDNIOODPORNE

przytulia czepna

### Baristo 500 SC

- ✔ skuteczna i tania ochrona truskawki,
- ✔ znana i ceniona substancja aktywna,
- ✔ skuteczne zwalczanie chwastów w okresie ich kiełkowania w glebie,
- ✔ niszczenie chwastów wschodzących jesienią i wiosną,
- ✔ działanie także w warunkach bezdeszczowej pogody – przenika do chwastów tuż po wystąpieniu opadów, skutecznie hamując ich rozwój.

### Stosowanie Baristo 500 SC

#### Na nowo założonych plantacjach

środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców w fazie, gdy stare liście zamierają -BBCH 97).  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **3,6 l/ha**.

#### Na plantacjach jednorocznych i starszych

środek stosować wiosną po ruszeniu vegetacji (BBCH 12-17).  
Dawka dla jednorazowego zastosowania:  
**1,8 – 3,6 l/ha**.