

Baristo^{500 SC}

**Skoncentrowany
na zwalczaniu
chwastów**

Jesienna ochrona
herbicydowa **pozwała
wykluczyć wiosenne
pielenie** mechaniczne
i kosztowne
pielenie ręczne
w międzyrzędziach.

TRUSKAWKA

**Wyższa zawartość
napropamidu o 11%***

Niższa dawka*

**Skuteczna
i tańsza ochrona***



INNIGO SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa

innigo
Better chemistry

www.innigo.com
  
#wybieramINNIGO

* w stosunku do środka standardowego zawierającego 450 g/l nappropamidu.

Baristo^{500 SC}

**Skuteczna i tania
ochrona truskawki**

Baristo 500 SC wnika do rośliny poprzez okrywą nasienną, korzenie lub liście. Środek zwalcza siewki wielu uciążliwych chwastów takich jak np. gwiazdnica, komosa, maruna, rdestówka powojowata, stwarzając sprzyjające warunki dla wzrostu i rozwoju truskawki.

Najważniejszy czas na pielęgnację plantacji zaczyna się tuż po zbiorach i od niego zależy plonowanie w kolejnym sezonie. Na plantacjach, na których kontynuowana będzie produkcja w kolejnym roku, istotne jest wykonanie kilku zabiegów agrotechnicznych takich jak nawożenie, niszczenie rozlogów i kontrola zachwaszczenia.



Stosowanie Baristo 500 SC

Na nowo założonych plantacjach



Na plantacjach jednorocznych i starszych

Środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców w fazie, gdy stare liście zamierają – BBCH 97).

Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **3,6 l/ha.**

Dawka dla jednorazowego zastosowania: **1,8 – 3,6 l/ha.**

Chwasty

WRAŻLIWE

- bodziszek drobny
- gwiazdnica pospolita

- komosa biała
- maruna bezwonna
- rumian polny

- rdestówka powojowata
- tasznik pospolity

ŚREDNIOWRAŻLIWE

- chaber bławatek
- iglica pospolita
- tobołki polne

ŚREDNIOODPORNE

- przytulia czepna

Znana i ceniona substancja aktywna.

Skuteczne zwalczanie chwastów w okresie ich kielkowania w glebie.

Niszczenie chwastów wschodzących jesienią i wiosną.

Baristo 500 SC działa także w warunkach bezdeszczowej pogody – przenika do chwastów tuż po wystąpieniu opadów, skutecznie hamując ich rozwój.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.