

Działanie na chwasty



Badania rejestracyjne
95-100% skuteczności ++
90-95% skuteczności ++/+

Chwast	Poziom zwalczania
Chaber bławatek	+++
Gwiazdnica pospolita	+++
Mak polny	++/+
Maruna bezwonna	+++
Przytulia czepna	+++
Rumian polny	+++
Samosiewy rzepaku	+++
Tasznik pospolity	+++

Skontaktuj się z doradcą w Twoim regionie

Dane kontaktowe znajdują się
na naszej stronie internetowej
www.innvigo.com/gospodarstwa



www.innvigo.com



#wybieramINNVIGO

innvigo
Better chemistry

HAPI
250 EC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Nie martw się,

masz **HAPI**
250 EC

NOWOŚĆ!



**HERBICYD DO ZWALCZANIA UCIĄŻLIWYCH
CHWASTÓW DWULÍSCIENNYCH W ZBOŻACH**

HAPI 250 EC to selektywny herbicyd o działaniu układowym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Jest to zaawansowane rozwiązanie do nalistnego zwalczania szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Dzięki połączeniu trzech substancji czynnych o różnych mechanizmach działania, środek skutecznie eliminuje nawet trudne do zwalczenia chwasty.

Mechanizm działania (HRAC 4 + 2): Środek łączy działanie syntetycznych auksyn (chlorypyralid, fluroksypyr – grupa 4) oraz inhibitora ALS (florasulam – grupa 2). Auksyny powodują deformacje i zahamowanie wzrostu poprzez zakłócenie podziałów komórkowych, natomiast florasulam blokuje syntezę aminokwasów. Środek pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany do korzeni, powodując zamieranie całych roślin.

SUBSTANCJE CZYNNE

chlorypyralid

120 g/l (11,08%)

fluroksypyr

120 g/l (11,08%)

florasulam

10 g/l (0,92%)



trudne, odporne chwasty dwuliścienne

0,5 l/ha

Najlepszy efekt
przy temperaturach
średniodobowych
ok 10°C



BBCH 21 25 29 30 31 32

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
chwasty dwuliścienne

Maksymalna dawka dla
jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: od początku
krzewienia do fazy drugiego kolanka. **BBCH 21-32**

Uprawy
małoobszarowe

- pszenica orkisz,
- pszenica płaskurka,
- pszenica samopsza,
- pszenica twarda,
- żyto jare

ZWALCZANIE UCIAŹLIWYCH CHWASTÓW
DWULIŚCIENNYCH W ZBOŻACH:



Zwalczanie trudnych,
odpornych chwastów
dwuliściennych

Poprawkowe
po zabiegach
jesiennych

Opóźnione
zabiegi
interwencyjne