

Astron 350 SE



DITIANON



Astronomiczna ochrona

TWOICH SADÓW

Nowoczesna, płynna formuła SE



Wysoka skuteczność

Blokuje kiełkowanie zarodników grzyba *Venturia inaequalis*.



Doskonała przyczepność

Specjalna formuła sprawia, że środek równomiernie pokrywa liście i owoce, tworząc trwałą barierę ochronną.



Odporność na zmywanie

Po wyschnięciu na powierzchni rośliny wykazuje wysoką odporność na opady deszczu.



Bezpieczeństwo i elastyczność

Możliwość stosowania od nabrzmiewania pąków aż po fazę wzrostu owoców.



Synergia w mieszaninach

Idealny partner do budowania strategii ochrony w mieszaninach zbiornikowych (np. z pirymetanilem).



Solidna baza ochrony Twojego sadu

Niezawodna ochrona przeciw parchowi jabłoni

Astron 350 SE to nowoczesny fungicyd o działaniu powierzchniowym, stworzony z myślą o profesjonalnych sadownikach. Dzięki unikalnej formulacji SE (zawieszina-emulsja) oraz sprawdzonej substancji czynnej – ditianon (350 g/l) – środek ten stanowi fundament zapobiegawczej ochrony przed parchem.



ZAKRES STOSOWANIA



Uprawy: Zwalczane choroby:
Jabłoń Parch jabłoni

Zalecana dawka Termin stosowania

Astron 350 SE SOLO

1,0 – 1,4 l/ha Od nabrzmiewania pąków do fazy, gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

Astron 350 SE W mieszaninie (np. z Batalion 450 SC)

0,85 l/ha (+ partner) Od końca nabrzmiewania pąków do fazy owoców o wielkości 20 mm (BBCH 52-72).

KLUCZOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4.
- Odstęp między zabiegami: 7 – 11 dni (przy stosowaniu solo) lub 7 – 16 dni (w mieszaninie).
- Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha (dostosować do wielkości drzew).
- Okres karencji: 28 dni.

WSKAZÓWKI STOSOWANIA

1. Profilaktyka to podstawa:

Astron 350 SE jest środkiem zapobiegawczym. Najlepsze efekty uzyskasz stosując go przed planowanymi infekcjami.

2. Przygotowanie cieczy:

Przed przystąpieniem do pracy dokładnie ustal potrzebną ilość wody. Opryskuj zawsze z włączonym mieszadłem.

3. Technika zabiegu:

Zalecane opryskiwanie średniokropliste. Pamiętaj o dokładnym pokryciu wszystkich części rośliny.

Ochrona owadów pożytecznych

Zaleca się wykonywanie zabiegów poza okresami aktywności pszczoł.