

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie



INSEKTYCYDY



FUNGICYDY



FRUITSMART



NAWOZY SPECJALISTYCZNE
BIOSTYMULATORY



HERBICYDY



REGULATORY
WZROSTU



PRODUKTY DLA SADOWNICTWA I WARZYWNICTWA



ADIUWANTY

inn ISO
Better chemistry



REWELACYJNE
CENY!



POLSKI
PRODUCENT



NAJLEPSZA
JAKOŚĆ

Heros 450 SC

Zawartość substancji czynnej:

pirymetanil (związek z grupy anilinopyrimidyn) – 450 g/l (41,40 % w/w)

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ - PARCH JABŁONI

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **1,0 l/ha**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,7 – 1,0 l/ha**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej **7 dni**

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55–69), zapobiegawczo co 7 – 10 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.

Zalecana ilość wody: **500–750 l/ha**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

Okres karencji: **28 dni**

GRUSZA - PARCH GRUSZY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **1,0 l/ha**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,7 – 1,0 l/ha**

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2**

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej **7 dni**

WYGRANA BATALIA O ZDROWIE OWOCÓW



Heros 450 SC

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55–69), zapobiegawczo co 7 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji. Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Zalecana ilość wody: **500 – 750 l/ha**

Zalecane opryskiwanie **średniokropliste**

Okres karencji: **28 dni**

TRUSKAWKA - SZARA PLEŚŃ

MALINA - SZARA PLEŚŃ, PRZYPĄKOWE ZAMIERANIE PĘDÓW

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **1,66 l/ha**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2**

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej **7 dni**

Termin stosowania:

TRUSKAWKA:

Środek stosować od początku fazy kwitnienia do dojrzałości owoców (BBCH 61–87), przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego z belką typu *Fragaria* lub opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

Zalecana ilość wody: **500 – 750 l/ha**

Zalecane opryskiwanie **średniokropliste**

Okres karencji: **3 dni**

MALINA:

Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami w pełni kwitnienia oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów (BBCH 65–87), przy użyciu opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

Zalecana ilość wody: **1000 l/ha**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste**

Okres karencji: **3 dni**





LEKARO 80 WG

Zawartość substancji czynnej:

kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80,34%)

OPIS DZIAŁANIA

LEKARO 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ - PARCH JABŁONI

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **1,9 kg/ha**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **10**

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej **7 dni**

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55). W sezonie wykonać 8–10 zabiegów, w odstępie co 7–8 dni. Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75). Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.

Zalecana ilość wody: **600 – 700 l/ha**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

Okres karencji: **28 dni**



NOWOŚĆ



LEKARO 80 WG

**NIEZASTĄPIONY W KAŻDYM SADZIE
FUNGICYD ZAWIERAJĄCY
SUBSTANCJĘ CZYNNĄ KAPTAN**

- ✓ Sprawdzona substancja czynna
- ✓ Rewelacyjna cena



Vigofun 250 EC

Zawartość substancji czynnej:

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

OPIS DZIAŁANIA

VIGOFUN 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ - PARCH JABŁONI

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,2 l/ha**

Liczba zabiegów: **3**

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej **10 dni**

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco. Zabiegi wykonywać w okresie od fazy zielonego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 56–69), co 10–14 dni, nie więcej niż 1–3 razy w sezonie.

JABŁOŃ - MACZNIAK JABŁONI

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,2 l/ha**

Liczba zabiegów: **3**

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej **7 dni**

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od fazy pojawienia się pąków do początku rozwoju owoców (BBCH 55–71), co 7–14 dni, nie więcej niż 1–3 razy w sezonie.

Zalecana ilość wody: **750 l/ha**

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

Okres karencji: **28 dni**

**PARCH I MACZNIAK
NIE MAJĄ ŻADNYCH SZANS**





DeLux 050 CS

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,93% w/w)

OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w roślinach rolniczych: rzepaku ozimym, pszenicy ozimej oraz jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ - MSZYCA JABŁONIOWA

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,25 l/ha**
 Środek w zalecanej dawce ogranicza również występowanie zwłók.
 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Zalecana ilość wody: **500–600 l/ha**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

Okres karencji: **7 dni**

Termin stosowania:

Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

DELUX 050 CS - niezastąpiona ochrona Twoich upraw!

- Nowoczesna formuła CS
- Dłuższe i skuteczniejsze zwalczanie szkodników

NOWE OBLCZE SPRAWDZONEGO INSEKTYCYDU





Los Ovados 200 SE

Zawartość substancji czynnej:

acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (18,80%)

OPIS DZIAŁANIA

LOS OVADOS 200 SE jest środkiem owadobójczym w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie jabłoni, wiśni i czereśni, orzechów włoskich i laskowych, gruszy, śliwy, pomidora szklarniowego, papryki szklarniowej, oberżyny szklarniowej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,125 l/ha**

Termin stosowania:

Od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania owoców, gdy owoce osiągną wielkość do 10 mm.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,2 l/ha**

Termin stosowania:

Od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1-2**

Okres karencji: **14 dni**

SKUTECZNOŚĆ SAMA W SOBIE

INSEKTYCYDY





Los Ovados 200 SE

WIŚNIA I CZEREŚNIA

Nasionnica trześniówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,125 l/ha**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania:

Opryskiwać w momencie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,125 l/ha**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania:

Opryskiwać w momencie po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Okres karencji: **14 dni**

GRUSZA

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,2 l/ha**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

0,125 – 0,2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej **20 dni**

Termin stosowania:

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją w fazach BBCH 69–87, od końca kwitnienia do dojrzałości owoców do zbioru.

Okres karencji: **14 dni**

ŚLIWA

Mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,2 l/ha**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

0,125–0,2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej **20 dni**

Termin stosowania:

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją w fazach BBCH 11–89; od fazy pierwszego liścia do dojrzałości konsumpcyjnej owoców.

Okres karencji: **14 dni**

POMIDOR, PAPRYKA I OBERŻYNA POD OSŁONAMI

Mączlik, szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,3 l/ha jeden raz w sezonie lub 0,2 l/ha dwa razy w sezonie**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

0,24 – 0,3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1 - 2**

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej **20 dni**

Termin stosowania:

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją w fazach BBCH 11–89; od fazy pierwszego liścia do pełnego wybarwienia owoców.

Okres karencji: **14 dni**

BARISTO 500 SC

Zawartość substancji czynnej:

napropamid (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będący koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek wnika do rośliny poprzez okrywą nasienną, korzenie lub liście. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych.

Stosowanie środka pojedynczo:

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, iglica pospolita, tobołki polne

Chwasty średnioodorne: przytulia czepna

Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KALAFIOR

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **2 l/ha**

Termin stosowania: Środek stosować przed siewem/sadzeniem.

Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm.

TRUSKAWKA

Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **3,6 l/ha**

Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **3,6 l/ha**

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **1,8 - 3,6 l/ha**

SKUTECZNY I SPRAWDZONY

HERBICYDY



Zawartość substancji czynnej:

1-metylocyklopropen (substancja z grupy pochodnych cyklopropenu) – **33 g/kg (3,3%)**

OPIS DZIAŁANIA

Środek z grupy regulatorów wzrostu, używany do utrzymywania wysokiej jędrności jabłek, opóźniania procesów przejrzenia i zmniejszeniu oparzelizny podczas przechowywania. Działa poprzez wyhamowanie produkcji etylenu i wszelkich procesów zachodzących w owocach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez sam owoc, jak i pobranego przez owoc z otoczenia. Jest sformułowany w postaci proszku zawartego w wodnorozpuszczalnych saszetkach, który zmieszany z wodą powoduje uwolnienie się lotnej substancji czynnej, która następnie przedostaje się do tkanek jabłka.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,068 g/m³ chłodzi**

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: **0,037 – 0,068 g/m³ chłodzi**

Termin stosowania:

Jabłka przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być dokonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających na zabieg w temperaturze powyżej 10°C. Zabieg może być dokonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C jak również w czasie chłodzenia.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: **1**

Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: **8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g**

WYKONANIE ZABIEGU

Pojemnik zaopatrzony w pompę do mieszania wody wypełnić wodą i umieścić w niewielkiej odległości od drzwi chłodni. Uruchomić pompę i woreczki foliowe z właściwie dobraną ilością środka wrzucić do pojemnika z wodą. Folia rozpuszcza się w ciągu 2 minut. W tym czasie chłodnię należy opuścić, szczelnie zamykając i zabezpieczając przed dostępem nieupoważnionych osób oraz umieścić tabliczkę „Zamknięte – nie wchodzić”. Pomieszczenia nie otwierać przez 24 godziny. Po tym czasie włączyć wentylację, otworzyć chłodnię i przed wejściem do niej wietrzyć przez 15 minut.

Smartujesz? Więcej zyskujesz!

POLSKI PRODUKT

FruitSmart to jedyny polski środek do przechowywania owoców zawierający 1-MCP

ŁATWY DOSTĘP

Legalny polski produkt, dostępny we wszystkich dobrych sklepach ze środkami ochrony roślin

MNIEJ USZKODZEŃ

Minimalizuje ryzyko uszkodzeń owoców i strat podczas przechowywania

DŁUŻSZA ŚWIEŻOŚĆ

Opóźnia procesy przejrzenia i sprawia, że owoce dłużej zachowują swoją naturalną świeżość

NIEZALEŻNOŚĆ

Samodzielna, łatwa aplikacja

LEGALNY I TANI

FruitSmart to legalny, polski produkt, posiadający zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UNIWERSALNOŚĆ

Do każdej, szczelnej przechowalni

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Pozwala zachować jakość owoców zarówno w transporcie, jak i na półkach sklepowych



WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Lepszy produkt to więcej możliwości sprzedaży, wyższa cena i zysk

Zastosuj legalny środek FruitSmart i ciesz się efektami swojej pracy.

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.



Krzemo

KRZEMO to unikalne połączenie nawozu mikroelementowego z łatwo przyswajalnym dla roślin krzemem. Innowacyjna formuła preparatu zawiera krzem w formie kwasu ortokrzemowego, czyli jedyną postać całkowicie dostępną i najszybciej asymilowaną przez rośliny. Dodatkowo zawarte w nim mikroelementy uzupełniają niedobory pokarmowe i wpływają korzystnie na procesy fizjologiczne roślin.

Kluczowe korzyści z zastosowania:

- Szybkie i efektywne dostarczenie krzemu w formie kwasu ortokrzemowego
- Podniesienie tolerancji roślin na niekorzystne warunki wzrostu
- Przyrost wysokiej jakości plonu

STOSOWANIE

Preparat **KRZEMO** polecany jest do stosowania w większości upraw sadowniczych, krzewów jagodowych oraz warzyw. **KRZEMO** w formie roztworu wodnego aplikuje się nalistnie. Może być stosowany łącznie z innymi nawozami. Należy przeprowadzić test sprawdzający możliwość stosowania roztworu wieloskładnikowego.

Zalecana dawka w zależności od uprawy: **0,5–0,8 l/ha**
Ilość cieczy użytkowej: **200 – 300 l/ha dla upraw rolniczych, w przypadku upraw ogrodniczych 400 – 1000 l/ha**

SKŁAD NAWOZU

Składniki	% (m/m)
Kwas ortokrzemowy	2,5
Bor (B) całkowity	0,3
Miedź (Cu) całkowita	1,0
Molibden (Mo) całkowity	0,2
Cynk (Zn) całkowity	0,6

SKUTECZNOŚĆ TKWI W FORMIE



MACORESCO

MACORESCO to płynny preparat biostymulujący aktywujący wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Zawiera amonowy octanu cynku, wyróżniający się działaniem pobudzającym hormony stymulujące rozwój i wzrost rośliny. Preparat poprawia ukorzenianie się roślin poprzez wzrost masy korzeniowej, co w efekcie korzystnie wpływa na ich wzrost i plonowanie. Biostymulator zaleca się także stosować w celu przyspieszenia regeneracji korzeni po wystąpieniu warunków stresowych.

Kluczowe korzyści z zastosowania:

- Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego
- Poprawa zdolności pobierania i akumulowania składników pokarmowych
- Korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin

STOSOWANIE

Preparat polecany jest do stosowania w większości upraw rolniczych, wybranych gatunkach warzyw, truskawce, młodych nasadzeniach drzew owocowych. **MACORESCO** jest przeznaczony jest do stosowania dolisnego.

Zalecana dawka w zależności od uprawy: **0,8–1,2 l/ha**

Zalecana ilość wody dla upraw rolniczych **100–200 l/ha**, dla sadowniczych **500–1000 l/ha**, dla plantacji warzyw **400 – 600 l/ha**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste lub drobnokropliste**

SKŁAD NAWOZU

Składniki	% (m/m)
Azot (N) amonowy (NH ₄)	7,5
Cynk (Zn) całkowity	8,0
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie	8,0

W KORZENIU SIŁA!

NOWOŚĆ



NAWOZY SPECJALISTYCZNE I BIOSTYMULATORY

NAVU FORTE

NANOTECHNOLOGICZNY NAWÓZ DOLISTNY

NAVU FORTE to wieloskładnikowy nawóz dolistny zawierający składniki pokarmowe w postaci naturalnego pochodzenia nanocząsteczek. Preparat jest przeznaczony do dokarmiania wszystkich upraw. NAVU FORTE jest produkowany przy zastosowaniu nanotechnologii, czyli otrzymywaniu przez duże rozdrobnienie struktur o rozmiarach nanometrycznych tzw. nanocząsteczek.

Kluczowe korzyści z zastosowania:

- Wysoka i szybka przyswajalność składników pokarmowych
- Przyrost wysokiej jakości plonu
- Pobudzenie roślin do wzrostu i poprawa ich witalności

STOSOWANIE

Nawóz dolistny w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Dawka pojedynczej aplikacji to **4–5 kg/ha**, w zależności od rodzaju uprawy, wymieszana z **200–400 l** wody.

W zależności od uprawy zaleca się wykonanie od 1 do 4 zabiegów. Stężenie cieczy opryskowej to **1–2,5%**. Należy ściśle przestrzegać **pH 6–10** aplikowanej cieczy opryskowej.

SKŁAD NAWOZU

Zawartość składników pokarmowych	% (m/m)
Azot (N) całkowity	8,0
Azot (N) w formie amidowej	8,0
Tlenek potasu (K ₂ O) rozpuszczalny w wodzie	10,0
Wapń całkowity w przeliczeniu na CaO	21,0
Tlenek magnezu (MgO) całkowity	3,0
Trójtlenek siarki (SO ₃) rozpuszczalny w wodzie	10,0
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie	0,10
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie	0,10
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie	0,10
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie	0,05



Silitop

SILITOP to unikatowy preparat zwilżający, który zwiększa przyczepność oprysku i znacząco poprawia wnikanie pestycydów w głąb rośliny. SILITOP zawiera w swoim składzie modyfikowany politerem trisiloksan i niejonowy zwilżacz.

Adiuwant jest polecany do: herbicydów z grupy sulfonilomoczników, herbicydów totalnych opartych o glifosat, herbicydów opartych o sole słabych kwasów, fungicydów i insektycydów w sytuacjach, kiedy zależy nam na dobrym pokryciu cieczą opryskową, nawozów dolistnych.

Kluczowe korzyści z zastosowania:

- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka ochrony roślin lub roztworu nawozu dolistnego,
- lepsze zwilżenie powierzchni liścia,
- poprawienie wnikania roztworu do rośliny,
- zwiększenie skuteczności działania środka ochrony roślin lub nawozu,
- zmniejszenie ilości wody użytej do oprysku o połowę

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

SILITOP należy stosować w terminach i w sposób zalecany dla poszczególnych środków ochrony roślin lub nawozów dolistnych.

Zalecana dawka: **50 – 100 ml/ha** preparatu w **200 – 300 l** lub zalecaną przez producenta środka ochrony roślin lub nawozu ilości wody.

Zalecane stężenie: **0,025 – 0,05%** (25 – 50 ml preparatu na 100 litrów wody)

PEWNY EFEKT ZABIEGÓW



POZNAJ NASZYCH DORADCÓW

Sprawdź obszar naszych działań i umów się z nami na spotkanie!

ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE

👤 Thomas Zisopulos

☎ + 48 530 570 703

✉ thomas.zisopulos@innvigo.com

KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE

👤 Sławomir Sylwestrzak

☎ + 48 723 683 560

✉ slawomir.sylwestrzak@innvigo.com

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE

👤 Karol Kaczorek

☎ + 48 530 570 881

✉ karol.kaczorek@innvigo.com

PODLASKIE, MAZOWIECKIE

👤 Wojciech Zawalich

☎ + 48 530 570 899

✉ wojciech.zawalich@innvigo.com

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE

👤 Radosław Bończak

☎ + 48 535 564 305

✉ radoslaw.bonczak@innvigo.com

POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE

👤 Arkadiusz Sojka

☎ + 48 535 535 738

✉ arkadiusz.sojka@innvigo.com

WIELKOPOLSKIE

👤 Witold Dzitkowski

☎ + 48 530 570 933

✉ witold.dzitkowski@innvigo.com

MAZOWIECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE

👤 Agnieszka Bober

☎ + 48 530 570 157

✉ agnieszka.bober@innvigo.com

DOLNOŚLĄSKIE

👤 Marek Szewców

☎ + 48 530 570 904

✉ marek.szewcow@innvigo.com

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE

👤 Waldemar Kamiński

☎ + 48 530 570 588

✉ waldemar.kaminski@innvigo.com

LUBELSKIE

👤 Marek Chojeła

☎ + 48 530 570 684

✉ marek.chojeta@innvigo.com

MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE

👤 Tomasz Chochorowski

☎ + 48 530 482 401

✉ tomasz.chochorowski@innvigo.com

LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE

👤 Dominik Popławski

☎ + 48 530 081 760

✉ dominik.poplawski@innvigo.com

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

EDYCJA 2018

POLSKI PRODUCENT ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW SPECJALISTYCZNYCH



INNIGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
www.innvigo.com

☎ +48 (22) 468 26 70
✉ biuro@innvigo.com
f facebook.com/innvigo
ig instagram.com/innvigo_eu

