

Makler 250 SE

ZAWSZE DOBRA INWESTYCJA



Pytaj u DOBRYCH sprzedawców środków ochrony roślin w swojej okolicy



Septorioza paskowana
liści pszenicy



Rdza brunatna (pszenica)



Plamistość siatkowa jęczmienia

POZNAJ NASZYCH DORADCÓW

Sprawdź obszar naszych działań i umów się z nami na spotkanie!

ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE

👤 Thomas Zisopulos
☎ +48 530 570 703
✉ thomas.zisopulos@innvigo.com

KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE

👤 Sławomir Sylwestrzak
☎ +48 723 683 560
✉ slawomir.sylwestrzak@innvigo.com

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE

👤 Karol Kaczorek
☎ +48 530 570 881
✉ karol.kaczorek@innvigo.com

PODLASKIE, MAZOWIECKIE

👤 Wojciech Zawalich
☎ +48 530 570 899
✉ wojciech.zawalich@innvigo.com

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE

👤 Radosław Bończak
☎ +48 535 564 305
✉ radoslaw.bonczak@innvigo.com

POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE

👤 Arkadiusz Sojka
☎ +48 535 535 738
✉ arkadiusz.sojka@innvigo.com

WIELKOPOLSKIE

👤 Witold Dzitkowski
☎ +48 530 570 933
✉ witold.dzitkowski@innvigo.com

MAZOWIECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE

👤 Agnieszka Bober
☎ +48 530 570 157
✉ agnieszka.bober@innvigo.com

DOLNOŚLĄSKIE

👤 Marek Szewcow
☎ +48 530 570 904
✉ marek.szewcow@innvigo.com

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE

👤 Waldemar Kamiński
☎ +48 530 570 588
✉ waldemar.kaminski@innvigo.com

LUBELSKIE

👤 Marek Chojęta
☎ +48 530 570 684
✉ marek.chojeta@innvigo.com

MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE

👤 Tomasz Chochorowski
☎ +48 530 482 401
✉ tomasz.chochorowski@innvigo.com

LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE

👤 Dominik Popławski
☎ +48 530 081 760
✉ dominik.poplawski@innvigo.com

UWAGA ! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

POLSKI PRODUCENT ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW SPECJALISTYCZNYCH



INNIGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
www.innvigo.com

☎ +48 (22) 468 26 70
✉ biuro@innvigo.com
f facebook.com/innvigo
i instagram.com/innvigo_eu



Dobre rozwiązania nie muszą być drogie



REWELACYJNA
CENA



MAKLER 250 SE

(azoksystrobina)

ZAWSZE DOBRA INWESTYCJA

- ✓ Sprawdzona ochrona fungicydowa zbóż i rzepaku.
- ✓ Doskonały komponent do mieszanin z innymi fungicydami.
- ✓ Szerokie spektrum zwalczanych chorób + elastyczne okno stosowania.

MAKLER 250 SE

ZAWSZE DOBRA INWESTYCJA

Makler 250 SE jest fungicydem w formie zawiesino-emulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby. Zawartość substancji czynnej: **azoksystrobina** (związek z grupy strobiluryn) - 250 g/l.

Azoksystrobina – informacje o substancji aktywnej

- Działa wgłębnie i układowo – równomierne rozmieszczenie substancji aktywnej w całej roślinie.
- Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób.
- Długość działania do ośmiu tygodni (przy zastosowaniu maksymalnej rejestrowanej dawki).
- Pozytywny wpływ na fizjologię roślin:
 - ✔ poprawia intensywność fotosyntezy – efekt zieloności
 - ✔ lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i wody
 - ✔ ogranicza negatywny wpływ stresów na roślinę
- Poprawia elastyczność łuszczyń, przez co ogranicza osypywanie się nasion w rzepaku.
- Działa plonotwórczo.
- Wpływa na lepszą jakość ziarna/nasion.
- Elastyczna w budowaniu programów ochrony z innymi fungicydami.

Makler 250 SE – informacje o produkcie


ZAKRES STOSOWANIA

Zboża: Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary:

- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
- Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
- Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
- Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

	Pszenica ozima	Pszenżyto ozime	Jęczmień jary
Zwalczane choroby	Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania).	Rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania).	Rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.
Stosowanie	Zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65).	Zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65).	Zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1-2 razy w sezonie, od początku fazy strzelania w źdźbło do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Ochrona fungicydowa zbóż



Rzepak ozimy:

- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
- Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
- Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zwalczane choroby	Terminy stosowania
Czerń krzyżowych, szara pleśń	Zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają do fazy, gdy 10% łuszczyń osiągnęło typową wielkość (BBCH 65–71).
Zgnilizna twardzikowa	Zapobiegawczo w fazie widocznych nadal zamkniętych pojedynczych pąków kwiatowych – kwiatostany boczne do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają (BBCH 58-65).

Ochrona fungicydowa rzepaku

